



INTISARI

Latar Belakang: Asupan makan yang inadekuat merupakan salah satu penyebab utama kejadian *stunting* pada anak. *Responsive feeding* diketahui berhubungan dengan asupan makan anak. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara *responsive feeding* ibu dengan asupan makan anak *stunting* usia 2-5 tahun. **Metode:** Penelitian ini adalah penelitian *cross-sectional* yang melibatkan 92 ibu yang memiliki anak *stunting* usia 2-5 tahun. *Responsive feeding* diukur dengan kuesioner RFPAT yang sudah divalidasi, dan asupan makan diukur dengan *recall* 2x24 jam. Analisis data menggunakan uji korelasi *Spearman* ($p < 0,05$). **Hasil:** Sebanyak 52,2% ibu memiliki praktik *responsive feeding* yang buruk. Kebanyakan anak tidak memenuhi 80% kebutuhan energi, karbohidrat, dan lemak sesuai dengan standar AKG, tetapi mayoritas anak (92,5%) memenuhi lebih dari 80% kebutuhan proteinnya. Tidak ada hubungan yang signifikan secara statistik antara *responsive feeding* ibu dengan asupan makan anak *stunting*. **Kesimpulan:** Tidak ada hubungan yang signifikan secara statistik antara *responsive feeding* ibu dengan asupan makan anak *stunting*. Perlu dilakukan penelitian lain yang lebih mendalam terkait interaksi ibu dan anak saat makan, praktik pemberian makan anak yang tepat, dan hubungannya dengan asupan makan anak.

KATA KUNCI: *responsive feeding*; *stunting*; asupan makan ;ibu; balita

ABSTRACT

Background: Inadequate food intake is one of the stunting determinant in children. Responssive feeding is related to children's food intake. **Objective:** This study aimed to determine the relation between maternal responsive feeding and food intake of stunting children aged 2-5 years. **Methods:** This study was a cross-sectional study. 92 mothers who had stunted children aged 2-5 years were participated. Responssive feeding was measured by a validated RFPAT questionnaire, and food intake was measured by 2x 24 hour recall. Data were analysed using Spearman correlation test ($p < 0.05$). **Results:** 52.2% of mothers had bad responsive feeding practices. Most children did not meet 80% of their energy, carbohydrate, and fat needs according to the RDA standards, but the majority of children (92.5%) met more than 80% of their protein needs. There is no statistically significant relationship between maternal responsive feeding and the stunting child's food intake. **Conclusion:** There is no statistically significant relationship between responsive feeding of mothers and food intake of stunting children. It is necessary to conduct other more in-depth research related to the interaction of mother and child when eating, proper child feeding practices, and its relationship with children's food intake.

KEY WORDS: responsive feeding; stunting; food intake; mother; children



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Hubungan Responsive Feeding Ibu dengan Asupan Makan Anak Stunting Usia 2-5 Tahun di Sleman
ADISTI QAMAHADLINA L, Dr. Toto Sudargo, S.K.M., M.Kes; Dr. Susetyowati, DCN., M.Kes
Universitas Gadjah Mada, 2022 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>