

## INTISARI

**Latar Belakang:** Prevalensi kejadian hipertensi di dunia terus meningkat dan berdampak pada meningkatnya komplikasi hingga kematian. Penderita hipertensi perlu menyadari bahwa pengendalian tekanan darah perlu dilakukan untuk meminimalisir komplikasi (perilaku pencarian pengobatan). Hasil-hasil penelitian menunjukkan faktor yang memengaruhi perilaku pencarian pengobatan penderita hipertensi sudah banyak diketahui. Namun target belum tercapai dan faktor yang memengaruhi berbeda-beda tiap orang.

**Tujuan:** Mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi perilaku pencarian pengobatan penderita hipertensi ke pelayanan kesehatan di Sleman Yogyakarta dan mengetahui faktor yang dominan.

**Metode:** Penelitian ini dengan rancangan penelitian *case control*. Sampel diambil dengan teknik *total sampling* (135 orang). Pengambilan data menggunakan kuesioner. Analisis data menggunakan Mann-Whitney dan regresi logistik.

**Hasil:** Dari analisis multivariat menunjukkan faktor yang memengaruhi perilaku pencarian pengobatan penderita hipertensi yaitu pengetahuan, sikap, dan dukungan keluarga ( $p < 0.05$ ). Dukungan keluarga merupakan faktor yang paling dominan, dengan nilai OR 1,377.

**Kesimpulan:** Faktor yang memengaruhi perilaku pencarian pengobatan penderita hipertensi ke pelayanan kesehatan adalah pengetahuan, sikap, dan dukungan keluarga dan faktor yang dominan adalah dukungan keluarga.

**Kata Kunci:** perilaku pencarian pengobatan, hipertensi

## ABSTRACT

**Background:** The prevalence of hypertension in the world continues to increase and has an impact on increasing complications and even death. Patients with hypertension need to be aware that blood pressure control needs to be done to minimize complications (health-seeking behavior). The results of the study show that the factors that influence the behavior of seeking treatment for hypertension sufferers are well known. However, the target has not been achieved and the influencing factors are different for each person.

**Objectives:** To determine the factors that influenced the behavior of seeking treatment for hypertension sufferers to health services in Sleman Yogyakarta and to determine the dominant factors.

**Methods:** This research was a case-control research design. Samples were taken by total sampling technique (135 people). Collected data using a questionnaire. Data analysis using Mann-Whitney and linear regression.

**Results:** Multivariate analysis showed that the factors that influenced the behavior of seeking treatment for hypertension patients were knowledge, attitudes, and family support ( $p < 0.05$ ). Family support was the most dominant factor, with the OR value of 1.377.

**Conclusion:** The factors that influence the behavior of seeking treatment for hypertension sufferers to health services are knowledge, attitudes, and family support and the dominant factor is family support.

**Keywords:** health-seeking behavior, hypertension