



INTISARI

Telah dilakukan penelitian untuk mengetahui hubungan antara kecenderungan depresi dan kecemasan dengan dispepsia non ulkus pada 50 penderita dispepsia non ulkus di instalasi rawat jalan dan inap di Bagian Penyakit Dalam/Sub Bagian Gastroenterohepatologi RSUP dr. Sardjito Yogyakarta. Subjek kemudian dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu kelompok yang mempunyai kecenderungan depresi, kelompok yang mempunyai kecenderungan kecemasan, kelompok yang mempunyai kecenderungan depresi dan kecemasan, dan kelompok normal.

Penelitian dilakukan secara non eksperimental dan dengan menggunakan metode potong lintang (*cross-sectional*).

Dari hasil uji statistik menggunakan *Chi-square* dengan batas signifikan $p < 0,05$ dan *Mantel-Hanzel test* didapatkan hasil :

1. Tidak ada hubungan antara kecenderungan kecemasan dengan dispepsia non ulkus secara signifikan.
2. Orang yang mempunyai kecenderungan depresi kemungkinan untuk menderita dispepsia non ulkus 2 kali lebih besar dari orang normal secara signifikan.
3. Orang yang mempunyai kecenderungan depresi dan kecemasan kemungkinan untuk menderita dispepsia non ulkus 1,4 kali lebih besar dari orang normal secara signifikan.

Kata kunci : Kecemasan - Depresi - Dispepsia non ulkus.