

ABSTRAK

Latar Belakang : Kondiloma akuminata merupakan salah satu penyakit menular seksual yang disebabkan oleh *Human Papilloma Virus* (HPV). Kasus kondiloma akuminata di Indonesia tergolong cukup tinggi dan dapat terjadi pada pasien laki-laki maupun wanita. Kebiasaan berganti pasangan, tidak memakai pengaman ketika melakukan hubungan seksual, dan riwayat infeksi HIV meningkatkan risiko kejadian kondiloma akuminata. Manifestasi klinis pada pasien penderita kondiloma akuminata biasanya berupa gambaran morfologi bunga kol, papula berbentuk kubah, papula beratap datar, dan papula keratotik. Beberapa manifestasi klinisnya juga disertai erupsi lain seperti ulkus maupun erosi sehingga perlu diketahui lebih lanjut bentuk dan macam manifestasi klinis yang terjadi pada pasien laki-laki maupun wanita.

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk manifestasi klinis kondiloma akuminata pada pasien kondiloma akuminata heteroseksual di RS Dr. Sardjito. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak pasien, rumah sakit, dan masyarakat luas.

Metode: Penelitian ini menggunakan desain observasional analitik. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari pasien kondiloma akuminata heteroseksual yang bersumber dari data sekunder berupa rekam medis dan buku register. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan teknik *consecutive sampling* di RS Dr. Sardjito Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) selama periode Januari tahun 2021 hingga Desember tahun 2024. Data yang dicatat berupa karakteristik subjek pasien (umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan terakhir, riwayat penggunaan kondom, riwayat pasangan seksual multipel, dan cara berhubungan seksual) dan manifestasi klinis kondiloma akuminata.

Kata kunci: Kondiloma Akuminata, Human Papilloma Virus, HIV, Kutil Kelamin, Heteroseksual.

ABSTRACT

- Background:** Condyloma acuminata is a sexually transmitted disease caused by the Human Papilloma Virus (HPV). Cases of condyloma acuminata in Indonesia are quite high and can occur in both male and female patients. The habit of exchanging partners, not using protection during sexual intercourse, and history of HIV infection increase the risk of condyloma acuminata. Clinical manifestations in patients with condyloma acuminata are usually in the form of cauliflower morphology, dome-shaped papules, flat-topped papules, and keratotic papules. Some clinical manifestations are also accompanied by other eruptions such as ulcers and erosions, so it is necessary to know more about the forms and types of clinical manifestations that occur in young adult male and female patients.
- Objective:** This study aims to determine the clinical manifestations of condyloma acuminata in heterosexual condyloma acuminata patients at RS Dr. Sardjito. It is hoped that this research will provide useful information for patients, hospitals and the wider community.
- Methods:** This research uses an observational analytic design. The sample in this study consisted of heterosexual condyloma acuminata patients sourced from secondary data in the form of medical records and registration books. Data collection was carried out using consecutive sampling technique at RS Dr. Sardjito, Sleman Regency, Yogyakarta Special Region Province (DIY) during the period January 2021 to December 2024. Data recorded were patient subject characteristics (age, gender, highest level of education, history of condom use, history of multiple sexual partners, and method of sexual intercourse) and clinical manifestations of condyloma acuminata.
- Keywords:** Condyloma Acuminata, Human Papilloma Virus, HIV, Genital Warts, Heterosexual.