UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Hubungan antara Ekpres HPV dan FAS dengan Derajat Histopatologik pada Karsinoma Sel Skuamosa Serviks Uteri
Luke Harida Khasanna , Dr. Ahmad Ghozali, SpPA.; dr. Totok Utoro, DMedSc.; SpPA(K)
Universitas Gadjah Mada, 2007 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

ABSTRAK

Latar Belakang: Pada proses karsinogenesis sel skuamosa serviks uteri, dapat ditemukan adanya ekspresi HPV, sedangkan peran gen Fas pada karsinogenesis tersebut belumlah jelas. Oleh karena itu, muncul permasalahan bagaimana hubungan antara ekspresi HPV dan Fas, serta pengaruhnya terhadap derajat histologik karsinoma sel skuamosa serviks uteri.

Tujuan: Untuk mengetahui hubungan antara ekspresi HPV dan Fas dengan derajat histologik pada karsinoma sel skuamosa serviks uteri.

Metode: Penelitian ini adalah studi *cross sectional*. Tiga puluh tujuh sediaan karsinoma sel skuamosa serviks uteri digunakan sebagai subyek. Ekspresi HPV dan Fas dinilai secara imunohistokimia dengan menghitung persentase sel yang tercat positif dalam lima lapang pandang perbesaran kuat.

Hasil: Hubungan antara ekspresi HPV dan Fas dengan derajat histologik karsinoma sel skuamosa serviks tidak diperoleh hasil yang signifikan($p=0,500$ dan $p=0,855$). Demikian pula hasil yang diperoleh pada hubungan antara ekspresi HPV dan Fas ($p=0,085$).

Kesimpulan: Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara statistik tidak didapatkan hubungan yang bermakna antara ekspresi HPV dan Fas dengan derajat histologik, serta tidak didapatkan hubungan yang bermakna antara ekspresi HPV dan Fas pada karsinoma sel skuamosa serviks uteri.

Kata Kunci: -HPV -Fas -derajat histologik -karsinoma sel skuamosa -serviks uteri