

INTISARI PENELITIAN

Latar Belakang: Gangguan yang ditimbulkan akibat penyakit stroke menyebabkan pasien stroke mengalami gangguan dalam memenuhi aktivitas sehari-hari baik berpindah atau bergerak maupun dalam perawatan diri. Salah satu masalah perawatan diri pada pasien stroke dapat dirujuk pada diagnosis keperawatan *feeding self care deficit*.

Tujuan: Untuk mengetahui gambaran intervensi keperawatan berdasarkan *Nursing Interventions Classifications self care deficit: Feeding* pada pasien stroke dengan diagnosis keperawatan *feeding self care deficit* di RSUP Dr Sardjito.

Metode: Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan desain penelitian cross-sectional. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari – Februari 2018 dengan teknik pemilihan sampel *event sampling* selama 30 hari. Sebanyak 24 responden terlibat dalam penelitian ini dan pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian yang dibuat berdasarkan *label Nursing Interventions Classifications (NIC) Self Care Deficit: Feeding*. Analisis data menggunakan distribusi frekuensi.

Hasil: Responden penelitian ini didominasi oleh perempuan (58, 3%) dengan usia rata-rata 55 tahun. Responden penelitian yang menderita stroke jenis iskemik adalah sekitar 37, 5% dan stroke jenis hemoragi sekitar 62,5%. Responden terbanyak dalam skor Indeks Barthel adalah 0 dengan kriteria menggunakan Nasogastric Tube (NGT). Aktivitas Intervensi pada NIC yang dilakukan 100% pada pasien stroke dengan menggunakan NGT atau tanpa menggunakan NGT adalah sebanyak 7 aktivitas dan 10 aktivitas lain tidak mencapai 100%.

Kesimpulan: Tidak semua aktivitas dalam *Nursing Interventions Classifications Self care deficit: Feeding* dilaksanakan 100% pada pasien stroke.

Kata kunci: Intervensi Keperawatan, *Nursing Interventions Classifications*, indeks barthel, stroke

ABSTRACT

Background: Disorder by stroke causes the stroke patients to suffer disorder in fulfilling their daily activities when and self care. One of the problems in self care on stroke patients may be referred to the nursing diagnosis on feeding self care deficit

Goal: to identify the overview of nursing intervention based on nursing Interventions Classifications self care deficit: Feeding on stroke patients by nursing diagnosis on feeding self care deficit at RSUP Dr Sardjito.

Method: This research uses descriptive quantitative by cross-sectional research design. This research was conducted on January – February 2018 about 30 days by even sampling technique. There were 24 respondents involved in the research and data sampling by research instrument by Nursing Interventions Classification (NIC) Self Care Deficit: Feeding. Data analysis used frequency distribution.

Result: The respondents of this research were dominated by female (58,3%) with average age of 55 years old. The respondents of the research suffering ischemic stroke were about 37,5% and hemorrhagic stroke of 62,5%. The most respondents in the Barthel index was 0 with Nasogastric Tube (NGT) criteria. Interventions on NIC was 100% on stroke patients using NGT or not using NGT was 7 activity and 10 other activities not reaching 100%.

Conclusion: Not all activities in nursing interventions Classifications Self care deficit: Feeding was conducted 100% on stroke patients.

Key word: Nursing Intervention, Nursing Interventions Classifications, Barthel Index, Stroke.