



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, R., Ahmed, S., Qadir, M., and Ahmad, K. (2012). 'Ikterus Neonatorum in Near-Term and Term Infants', *Sultan Qaboos Univ Med J*, 12(May), pp. 153–160.
- Aliyyah. (2017). Hubungan Persalinan Caesarean Section dengan Kejadian Ikterus pada Neonatus. *Aisyah: Jurnal Ilmu Kesehatan*, pp. 14-19
- Anggraini, H. (2014). 'Faktor–faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Ikterus pada Neonatal', *Aisyah: Jurnal Ilmu Kesehatan*, pp.22-34
- Antonucci, R., Porcella, A., & Piloni, M. D. (2014). Perinatal asphyxia in the term newborn, *SM Liver Journal* 3(2), 1–14. <https://doi.org/10.7363/030269>
- Asl, W., Daud, S. M., Heon, T. S., Mun, C. Y., and Kutty, F. M. (2016). 'CPG UpDATE Management of Neonatal Jaundice in Primary Care', *Malaysian Family Physician*, 11(2), pp. 16-19.
- Badan Pusat Statistik (2015). "Profil Anak Indonesia 2015". Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA).
- Bala, J., Agrawal, Y., Chugh, K., Kumari, M., Goyal, V., and Kumar P. (2015). 'Variation in the Serum Bilirubin Levels in Newborns According to Gender and Seasonal Changes', *Arch Med Health Sci*, 3(1). doi: 10.4103/2321-4848.154945.
- Begum, S., Baki, M.A., Kundu, G., Islam, I., Talukdar, M. K., and Fatema, K. (2012). 'Exchange Transfusion: Indication and Adverse Effect', *Bangladesh J Child Health*, 36(1), pp. 16–19.
- Bhutani, V. K., Poland, R., Meloy, L. D., Hegyi, T., Fanaroff, A. A., & Maisels, M. J. (2016). 'Clinical Trial of Tin Mesoporphyrin to Prevent Neonatal Hyperbilirubinemia', *Journal of Perinatology*. Nature Publishing Group, pp. 1–7. doi: 10.1038/jp.2016.22.
- Bilgin, B. S., Koroglu, O. A., Yalaz, M., Karaman, S., and Kultursay, N. (2013) 'Factors Affecting Bilirubin Levels during First 48 Hours of Life in Healthy Infants', *Hindawi Journal*, pp. 154-159
- Birrer, R., Takuda, Y., & Takara, T. (2007). 'Hypoxic Hepatopathy: Pathophysiology and Prognosis', *The Japanese Society of Internal Medicine*, 46, pp. 1063–1070.



- Bracci, R., Perrone, S., & Buonocore, G. (2002). 'Oxidant Injury in Neonatal Erythrocytes during The Perinatal Period', *Acta Paediatr*, 91, pp. 130–134.
- Choudhary, M., Sharma, D., Dabi, D., Lamba, M., Pandita, A., & Shastri, S. (2015). Hepatic Dysfunction in Asphyxiated Neonate: Prospective Case-Controlled Study. *Clinical Medicine Insights: Pediatrics*, 9, 1–6. <https://doi.org/10.4137/CMPed.S21426>. Received
- Cohen, R. S., Wong, R. J., and Stevenson, D. K. (2018). 'End-Tidal Breath Carbon Monoxide Measurements: Current Directions Objectives', *Am J Obstet Gynecol*, 13(8).
- Cunningham, F., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Spong, C. Y., Dashe, J. S., Hoffman, B. I., Casey, B. M., and Sheffield, J. S. (2013). Neonatal Jaundice, *Williams Obstetrics*. 24th edn. New York: McGraw-Hill Education. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.
- Danaei, N., Iotfpour, S., Ghorbani, R., Emadi, A., and Nooripor, S. (2016). 'Evaluating the Diagnostic Value of Skin Bilirubin in Compassion with Plasma Bilirubin to Identify Hyperbilirubinemia in Healthy Babies', *Middle East J Rehabil Health*, 3(1).
- Darsono, P. V., Sinambela, D. P., dan Janah, M. (2016). 'Gambaran Sikap Ibu tentang Penanganan Ikterus Fisiologis pada Bayi Baru Lahir Di RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin', *Dinamika Kesehatan*, 7(2), pp. 210–219.
- Dasari, S., Naha, K., & Prabhu, M. (2012). 'An Unusual Cuse for Recurrent Jaundice in an Otherwise Healthy Male', *AMJ*, 5(10), pp. 541–543.
- Demiraran, Y., Albayrak, M., Seker, I. S., Kaynak, G., Iskender, A., Sezen, G. Y., and Ozdemir, I. (2011). 'Effect of Anesthesiological Strategies on Neonatal Bilirubin Levels during Cesarean Section: A Prospective and Randomized Trial', *Arch Gynecol Obstet*, pp. 1059–1065. doi: 10.1007/s00404-010-1783-8.
- Department of Health. (2014) 'Elective Surgery Patient Information', *Government of Western Australia*, (8), pp. 1–2.
- Dewi, V. (2012). "Asuhan Neonatus, Bayi, dan Anak Balita". Jakarta: *Salemba Medika*, pp. 234-238
- Downs, E. and Gourley, G. R. (2018). Neonatal Jaundice and Disorders of Bilirubin Metabolism in Nathan and Oski's Hematology and Oncology of Infancy and Childhood, 8/e. Eighth Edi. *Elsevier Inc*. doi: 10.1016/B978-1-4557-5414-4.00004-8.



- El-Kabbany, Z. A., Hamza, R. T., & Toaima, N. N. (2017). SM Gr up Early Hepatic Dysfunction in Asphyxiated Full Term Newborns. *SM Liver Journal*, 2(1), 1–5.
- Erlandsen, M. A., Willy, T., and Hansen, R. (2010). ‘Treatment of neonatal jaundice - more than phototherapy and exchange transfusions’, *Eastern Journal of Medicine*, 15, pp. 175–185.
- Firani, N. K. (2017). *Metabolisme Karbohidrat: Tinjauan Biokimia dan Patologis*. Surabaya. Available at: [https://books.google.co.id/books?id=RzNTDwAAQBAJ&pg=PA3&lpg=PA3&dq=glikogen+dan+bilirubin&source=bl&ots=nC-6TQDmTJ&sig=aEiparpA\\_j4kGq-Gl\\_r-aSQBDBM&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwiV-o-f7draAhVKMI8KHAlYCJIQ6AEIUTAF#v=onepage&q=glikogen dan bilirubin&f=false](https://books.google.co.id/books?id=RzNTDwAAQBAJ&pg=PA3&lpg=PA3&dq=glikogen+dan+bilirubin&source=bl&ots=nC-6TQDmTJ&sig=aEiparpA_j4kGq-Gl_r-aSQBDBM&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwiV-o-f7draAhVKMI8KHAlYCJIQ6AEIUTAF#v=onepage&q=glikogen%20dan%20bilirubin&f=false) (Accessed: 27 April 2018).
- Gupta, A., Gupta, P., Ali, S. S. L., and Gupta, S. (2016). “Effect of Mode of Delivery: Normal, Induced and Caesarean Section on Neonatal Serum Bilirubin”, *Indian Journal of Clinical Anatomy and Physiology*, 3, pp. 269–272. doi: 10.5958/2394-2126.2016.00060.8.
- Hamidi, M., Zamanzad, B., and Mesripour, A. (2013). ‘Original article: Comparing The Effect of Clofibrate and Pheno- Barbital on The Newborns with Hyperbilirubinemia’, *EXCLI Journal*, pp. 75–78.
- Hasvivin, Wahyuni, S. & Kadir, A. (2013). ‘Hubungan Frekuensi Pemberian ASI, Riwayat Asfiksia, dan Berat Badan Lahir dengan Angka Kejadian Ikterus Neonatorum di Ruang NICU RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makasar’, *STIKES Nani Hasanuddin Makasar*, 58(5), pp. 125–127.
- Hidayati, E. dan Rahmaswari, M. (2016). ‘Hubungan Faktor Ibu dan Faktor Bayi dengan Kejadian Hiperbilirubinemia pada Bayi Baru Lahir (BBL) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja, Jakarta Utara Tahun 2015’, *RAKERNAS AIPKEMA*, pp. 198-201.
- Hobbs, A. J., Mannion, Cynthia A., Mcdonald, Sheila W., Brockway, Merredith, Tough, Suzanne C. (2016). ‘The Impact of Caesarean Section on Breastfeeding Initiation, Duration, and Difficulties in The First Four Months Postpartum’, *BMC Pregnancy and Childbirth*, 16(1), p. 1.
- Hosea, M. K., Etika, R., dan Lestari, P. (2015). ‘Hyperbilirubinemia Treatment of Neonatus in Dr . Soetomo Hospital Surabaya’, *Folia Medica Indonesiana*, 51(3), pp. 183–186.
- Indrawati (2014). ‘Pendidikan Anak Usia Dini pada Masa Golden Age’, *Al-*



*Ashlah: Journal of Islamic Studies*, pp. 1–19.

- Isa, H. M., Mohamed, M. S., Mohamed, A. M., and Abdulla, A. (2017). 'Neonatal indirect hyperbilirubinemia and glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency', *Korean Journal of Pediatrics*, 60(4), pp. 106–111.
- Islam, T., Hoque, S. A., Matin, M., Islam, N., Hossain, A., Nazir, F., and Islam, S. (2010). 'Alteration of Hepatic Function: Helpful to Diagnose and Assess Severity of Perinatal Asphyxia', *Bangladesh J Child Health*, pp. 27-39.
- Islam, T., Hoque, S. A., Nazir, F., & Bhuiyan, M. R. (2012). Status of Serum bilirubin , Serum Proteins and Prothrombin time in babies with Perinatal Asphyxia. *J. Dhaka National Med. Coll. Hos.*, 18(02), 43–46.
- Itoh, S., Okada, H., Kuboi, T., and Kusaka, T. (2017). 'Phototherapy for neonatal hyperbilirubinemia', *Pediatrics International*, 59(9), pp. 959–966. doi: 10.1111/ped.13332.
- Jitowiyono, S. dan Kristiyanasari, W. (2010). Asuhan Keperawatan Neonatus Dan Anak. Jakarta: *Nuha Medika*, pp. 289-290.
- Kaabneh, M. A. F., Salama, G. S. A., Shakkoury, A. G. A., Al-Abdallah, I. M. H., Alshamari, A., and Halaseh, R. A. A. (2015). 'Phenobarbital and Phototherapy Combination Enhances Decline of Total Serum Bilirubin and May Decrease the Need for Blood Exchange Transfusion in Newborns with Isoimmune Hemolytic Disease', *Clinical Medicine Insights. Pediatrics*, pp. 67–72. doi: 10.4137/CMPed.S24909.
- Kaplan, M., Wong, R. J., Sibley, E., and Stevenson, D. K. (2018). Neonatal Jaundice and Liver Diseases. Tenth Edit, Fanaroff and Martin's Neonatal-Perinatal Medicine, 2-Volume Set. Tenth Edit. *Elsevier Inc.* doi: 10.1016/B978-1-4557-5617-9.00100-7.
- Kemendes RI (2017). Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2016. Jakarta: *Kementerian Kesehatan RI*.
- Kindieyenit, M., Gezahegn, T., Adefires, M., & Shiferaw, A. M. (2016). Cesarean Section Rate, Maternal and Fetal Outcome of Birth Following Cesarean Section at Finoteselam Hospital, Northwest Ethiopia: A Descriptive Retrospective Data. *Global Journal of Medical Research: E Gynecology and Obstetrics*, 16(3), pp. 23-29.
- Latama, Z. N., Tanuwidjaja, S., & Yulianti, A. B. (2014). 'Hubungan Antara Apgar Score dengan Kejadian Ikterus Neonatorum Fisiologis di RSUD Al-Ihsan Kabupaten Bandung Tahun 2014', *Prosiding Pendidikan Dokter*, 2(1), pp. 83–90.



- Lubis, B. M., Rasyidah, Syofiani, B., Sianturi, P., Azlin, E., and Tjipta, G. D. (2013). 'Rasio *Bilirubin* Albumin pada Neonatus dengan Hiperbilirubinemia', *Sari Pediatri*, 14(5), pp. 1–6.
- Maheshwari, A. dan Carlo, W. A. (2018). Digestive System Disorders. Twentieth, Nelson Textbook of Pediatrics, 2-Volume Set. Twentieth. *Elsevier Inc.* doi: 10.1016/B978-1-4557-7566-8.00102-2.
- Mardiani, T. H. (2004). 'Metabolisme Heme', *USU digital library*, pp. 1–7.
- Martin, R. J., Fanaroff, A. A., and Walsh, M. C. (2015). Fanaroff and Martin's Neonatal-Perinatal Medicine: Diseases of The Fetus and Infant. 10th edn. Philadelphia: Elsevier Inc. Available at: [https://books.google.co.id/books?id=AnVYBAAAQBAJ&pg=PA1635&lpg=PA1635&dq=mechanism+of+perinatal+infection+and+bilirubin&source=bl&ots=OeqDkslKuE&sig=IZMTvi96jwUGzo\\_i47Zl1kdSxyM&hl=id&sa=X&ved=0ahUKewiww9701fnaAhUKKo8KHYhpAbg4ChDoAQg4MAI#v=onepage&q=mechan](https://books.google.co.id/books?id=AnVYBAAAQBAJ&pg=PA1635&lpg=PA1635&dq=mechanism+of+perinatal+infection+and+bilirubin&source=bl&ots=OeqDkslKuE&sig=IZMTvi96jwUGzo_i47Zl1kdSxyM&hl=id&sa=X&ved=0ahUKewiww9701fnaAhUKKo8KHYhpAbg4ChDoAQg4MAI#v=onepage&q=mechan) (Accessed: 8 May 2018).
- Martiza, I. (2010). Ikterus. Dalam: Juffrie M, Soenarto S, Oswari H, Arief S, Rosalina I, Mulyani N. Buku ajar gastroenterology-hepatologi. Edisi ke-1. Jakarta: *Badan penerbit IDAI*.
- Mathindas, S., Wilar, R., dan Wahani, A. (2013). 'Hiperbilirubinemia pada Neonatus', *Jurnal Biomedik*, 5, pp. S4-10. Available at: <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/biomedik/article/view/2599/2142>.
- McDonald, S. dan Davies, L. (2014). Pemeriksaan Kesehatan Bayi Pendekatan Multidimensi. Jakarta: *Penerbit Buku Kedokteran EGC*.
- Míguez, C., Salto, M. F., and Marañón, R. (2015). 'Measurement of Transcutaneous Bilirubin with Bilicheck as a Jaundice Screening Method in Neonates in Pediatric Emergency Departments', *Open Journal of Pediatrics*, pp. 240–247.
- Mutianingsih, R. (2014). 'Hubungan Antara Bayi Berat Lahir Rendah dengan Kejadian Ikterus, Hipoglikemi, dan Infeksi Neonatorum di RSUP NTB Tahun 2012', pp. 78–83.
- Myles, F. M. D. (2009). Buku Ajar Bidan. Jakarta: *Buku Kedokteran EGC*, pp. 167-175.
- Notoatmodjo, S. (2012). Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: *Rineka Cipta*, pp. 46-54.
- Olusanya, B. O., Imam, Z. O., Emokpae, A. A., and Iskander, I. F. (2016).



- ‘Revisiting the Criteria for Exchange Transfusion for Severe Neonatal Hyperbilirubinemia in Resource-limited Settings’, *Neonatology*, 109(2), pp. 97–104. doi: 10.1159/000441324.
- Patel, A. S., Desai, D. A., and Patel, A. R. (2017). ‘Association of ABO and Rh Incompatibility With Neonatal Hyperbilirubinaemia’, *Int J Reprod Contracept Obstet Gynecol*, 6(4), pp. 1368–1375.
- Pinheiro, J. M. F., Tinoco, L. D. S., Rocha, A. S. S., Rodrigues, M. P., Lyra, C. O., and Ferreira, M. A. F. (2016). ‘Childcare in the Neonatal Period: Evaluation of Neonatal Mortality Reduction Pact in Rio Grande do Norte, Brazil’, *Ciência & Saúde Coletiva*, 21(1), pp. 243–252. doi: 10.1590/1413-81232015211.09912014.
- Prawirohardjo, S. (2010). Ilmu Kebidanan. Jakarta: *PT.Bina Pustaka*.
- Putri, R. A. (2012). ‘Hubungan Pemberian ASI dan Infeksi terhadap Ikterus Neonatorum’, *Jurnal Vokasi Indonesia*, pp. 5–23.
- Rahmy, D. (2015). ‘Hubungan Maturitas Bayi dengan Kejadian Ikterus Neonatorum Fisiologis di Ruang Gayatri RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo Mojokerto’, *Jurnal Vokasi Indonesia*.
- Riwidikdo, H. (2013). Statistik Kesehatan dan Aplikasi SPSS Dalam Prosedur Penelitian. Yogyakarta: *Rohima Press*.
- Rohani, S. dan Wahyuni, R. (2017). ‘Faktor–faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Ikterus pada Neonatus’, *Aisyah: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 2(1), pp. 75–80.
- Roselina, E., Pinem, dan S., Rochimah (2013). ‘Hubungan Jenis Persalinan dan Prematuritas dengan Hiperbilirubinemia di RS Persahabatan’, *Jurnal Vokasi Indonesia*, 1(1), pp. 74–81.
- RSUD Wonosari. *Rekam Medik Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari* (2016).
- RSUD Wonosari. *Rekam Medik Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari* (2017).
- Rukiyah, A. Y. dan Yulianti, L. (2012). *Asuhan Neonatus*. Jakarta: TIM.
- Saptanto, A., Kurniati, I. D., dan Khotijah, S. (2014). ‘Asfiksi Meningkatkan Kejadian Hiperbilirubinemia Patologis pada Bayi di RSUD Tugurejo Semarang’, *Jurnal Kedokteran Muhammadiyah*, (2), pp. 1–5.
- Sastroasmoro, S. S. I. (2014). Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Klinis Edisi ke-5. Jakarta: *CV. Sagung Seto*.



- Shortland, D. B., Hussey, M., and Chowdhury, A. D. (2008). 'Understanding neonatal jaundice: UK practice and international profile', *Journal of The Royal Society for the Promotion of Health*, 128(4), pp. 202–206. doi: 10.1177/1466424008092229.
- Stevenson, D. K. & Vreman, H. J. (2001). 'Carbon monoxide and bilirubin production in neonates', *Seminars in Perinatology*, 25(2), pp. 85–93. doi: 10.1053/sper.2001.23197.
- Sugiyono (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sukla, K. K., Tiwari, P. K., Kumar, A., & Raman, R. (2013). Low Birthweight (LBW) and Neonatal Hyperbilirubinemia (NNH) in an Indian Cohort: Association of Homocysteine, Its Metabolic Pathway Genes and Micronutrients as Risk Factors. *PLoS ONE*, 8(8), 1–8. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0071587>
- Sursilah, I., Hidayah, F. N., dan Ardiyanti, T. (2015). 'Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Ikterus pada Bayi di Ruang Perinatologi RSUD 45 Kuningan Januari s.d. Desember Tahun 2015', *Jurnal Kedokteran Muhammadiyah*, 16, pp. 112–127.
- Tazami, R. M., Mustarim, dan Syah, S. (2013). 'Gambaran Faktor Risiko Ikterus Neonatorum Pada Neonatus Di Ruang Perinatologi Rsud Raden Mattaher Jambi Tahun 2013'. Available at: <http://onlinejournal.unja.ac.id/index.php/kedokteran/article/view/981>.
- Townsel, C. D., Emmer, S. F., Campbell, W. A., and Hussain, N. (2017). 'Gender Differences in Respiratory Morbidity and Mortality of Preterm Neonates', *Frontiers in Pediatrics*, 5(January), pp. 1–6. doi: 10.3389/fped.2017.00006.
- Ullah, S., Rahman, K., and Hedayati, M. (2016). 'Hyperbilirubinemia in Neonates: Types, Causes, Clinical Examinations, Preventive Measures and Treatments- A Narrative Review Article', *Iranian Journal of Public Health*, 45(5), pp. 558–568.
- Veni, D. V. (2013). 'The Study On The Effect Of Gender On Serum Bilirubin Concentration In Infants With Neonatal Hyperbilirubinemia'. Available at: [http://www.ijpbs.net/cms/php/upload/2290\\_pdf.pdf](http://www.ijpbs.net/cms/php/upload/2290_pdf.pdf).
- Watchko, J. F. dan Tiribelli, C. (2013). 'Bilirubin-Induced Neurologic Damage- Mechanisms and Management Approaches', *New England Journal of*



- Medicine*, 369(21), pp. 2021–2030. doi: 10.1056/NEJMra1308124.
- WHO (2009). *Pelayanan Kesehatan Anak di Rumah Sakit*. Jakarta.
- Wibowo, S. (2010). ‘Perbandingan Kadar Bilirubin Neonatus dengan dan Tanpa Defisiensi Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase, Infeksi dan Tidak Infeksi’, *Jurnal Kedokteran Muhammadiyah*, pp. 26-45.
- Widiawati, S. (2017). Hubungan Sepsis Neonatorum , BBLR dan Asfiksia dengan Kejadian Ikterus pada Bayi Baru Lahir. *Riset Informasi Kesehatan*, 6(1)
- Wisnumurti, D. A., Sribudiani, Y., Porsch, R. M., Maskoen, A. M., Abdulhamied, L. I., Rahayuningsih, S. E., Asni, A. K., Sleutels, F., Kockx, C. E. M., Ijcken, W. F. J. V., Sukadi, A., and Achmad, T. H. (2018). ‘UGT1A1 Genetic Variations and a Haplotype Associated with Neonatal Hyperbilirubinemia in Indonesian Population’, *BioMed Research International*.
- Wong, R. J., Vreman, H. J., and Ahlfors, C. E. (2007). ‘Neonatal Jaundice: Bilirubin Physiology and Clinical Chemistry’, *NeoReviews*, 8(2), p. e58. doi: 10.1542/neo.8-2-e58.
- Yahya, N., Yuniati, T., and Lubis, L. (2017). ‘Characteristics of Neonatal Hyperbilirubinemia at West Java’s Top Referral Hospital, Indonesia’, *Althea Medical Journal*, 4(2), pp. 167–172.
- Zelenka, I. J. (2010). ‘Enterohepatic Circulation of Bilirubin’, *J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr.*, 64, pp. 1–27.
- Zhao, X., Li, Z., and Zhang, X. Y. (2010). ‘G6PD-MutDB: A Mutation and Phenotype Database of Glucose-6-Phosphate (G6PD) Deficiency’, *Journal of Bioinformatics and Computational Biology*, 8.
- Zwiers, C., Scheffer-Rach, M. E. A., Lopriore, E., Haas, M. D., and Liley, H. G. (2018) ‘Immunoglobulin for alloimmune hemolytic disease in neonates (Review)’, [\*Cochrane Database Syst Rev.\*](#), (3), pp. 3–6. doi: 10.1002/14651858.CD003313.pub2.Copyright.