

Abstrak

Latar Belakang: Pasien dengan penyakit kanker stadium lanjut memerlukan perawatan dan pemenuhan kebutuhan berdasarkan hasil pengkajian untuk mengidentifikasi gejala fisik, psikologi dan spiritualnya. Pengkajian yang hanya dilakukan pada pasien tidak mendapatkan hasil yang akurat karena kondisi paliatifnya, sedangkan pengkajian yang hanya dilakukan oleh perawat tidak menggambarkan kondisi pasien yang sebenarnya. Hasil pengkajian antara pasien dan perawat diperlukan untuk pemberian intervensi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pasien.

Tujuan: untuk mengetahui perbandingan hasil pengkajian *palliative care outcome scale* (POS) antara pasien kanker stadium lanjut dan perawat di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta dan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.

Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif perbandingan dengan rancangan penelitian *cross-sectional*. Pengambilan data dilakukan pada bulan Mei - Juni 2018. Penelitian melibatkan 106 pasien kanker stadium lanjut dan 61 perawat. Instrumen yang digunakan adalah *palliative care outcome scale* (POS) versi pasien dan perawat yang terdiri dari 10 domains. Analisis data menggunakan *Mann Whitney*.

Hasil: Hasil analisis statistik menunjukkan adanya perbedaan hasil pengkajian antara pasien dan perawat dengan menggunakan instrumen POS pada domain gejala lain ($p=0,029$), domain cemas ($p=0,030$) dan domain ketersediaan informasi ($p=0,001$). Sementara pada 7 domain yang lain menunjukkan tidak ada beda yang signifikan antara POS pasien dan POS perawat ($p>0,05$).

Kesimpulan: Terdapat perbedaan hasil pengkajian dengan menggunakan instrumen *palliative care outcome scale* (POS) pasien dan perawat pada domain gejala lain, cemas dan domain ketersediaan informasi.

Kata Kunci: *Palliative care outcome scale*, POS pasien, POS perawat, pasien kanker stadium lanjut.

Abstract

Background: Patients with advanced cancer require treatment and fulfillment of needs based on the results of assessment that identify physical symptoms and psychological and spiritual needs. assessments that are only carried out on patients do not get accurate results because of their palliative conditions, while assessments that are only carried out by nurses do not describe the actual condition of the patient. Comparison of the results of the assessment between patients and nurses is needed for the provision of interventions that are appropriate to the conditions and needs of the patient.

Objective: to compare the results of palliative care outcome scale (POS) assessment between advanced cancer patients and nurses at Dr. Sardjito Yogyakarta and RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto

Methods: This was a comparative descriptive study with cross-sectional research design. Data collection was carried out in May – June 2018. This study involved 106 advanced cancer patients and 61 nurses. This instruments used was the patient and nurse version of the palliative care outcome scale (POS) consisting of 10 domains. Data analysis using Mann whitney.

Results: The results of statistical analysis showed that there are differences in the results of the study between patients and nurses by using a POS instrument in the domain of other symptoms ($p = 0.029$), domains of feelings of anxiety ($p = 0.030$) and domain availability of information ($p = 0.001$). While on the other 7 domains showed no significant d difference between patient and nurse POS ($p > 0.05$).

Conclusion: There were differences in the results of palliative care outcome scale (POS) of patients and nurses in other symptom domains, anxiety feelings and information availability.

Keywords: Palliative care outcome scale, POS patients, POS nurses, advanced cancer patients.