

**MANAJEMEN PAKAN PADA AYAM PETELUR (LAYER) PERIODE
PRODUKSI DI FARM TRI HONGGO REZEKI (THR) JERUKSAWIT
GONDANGREJO KARANGANYAR JAWA TENGAH**

Oleh :

Laeli Robingatun Rizki
16/401265/SV/11769

INTISARI

Manajemen pakan pada ayam petelur memiliki pengaruh yang besar terhadap produktivitasnya. Manajemen pakan yang baik akan sejalan dengan produksi telur yang baik pula. Penulisan Tugas Akhir (TA) ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pakan pada ayam petelur periode produksi di *Farm* THR Jeruksawit Gondangrejo Karanganyar Jawa Tengah pada periode 3 – 15 Maret 2018. Materi yang digunakan untuk penulisan tugas akhir ini adalah data pengamatan serta praktek langsung di *Farm* THR. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan praktek langsung dalam kegiatan pemberian pakan. Ayam periode produksi di *Farm* THR dihitung mulai umur 22-70 minggu. Pakan yang diberikan berupa pakan racikan sendiri dengan kode L1, L3 dan L4. Pakan L1 berbentuk tepung (*mash*) dengan kandungan protein yang diberikan sebanyak 18,60%, methioinin 0,90%, kalsium 4,2%, fosfor 0,9% dan lain-lain. Pakan L3 berbentuk tepung (*mash*) dengan kandungan protein yang diberikan sebanyak 16,60%, methioinin 0,90%, kalsium 4,2%, fosfor 0,9% dan lain-lain. Pakan L4 berbentuk tepung (*mash*) dengan kandungan protein yang diberikan sebanyak 15,60%, methioinin 0,90%, kalsium 4,2%, fosfor 0,9% dan lain-lain. Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa manajemen pakan pada ayam petelur periode produksi di *Farm* THR sudah baik dan memenuhi kebutuhan nutrisi yang diperlukan ayam. Perlu dilakukan peningkatan kualitas pakan agar hasil lebih baik lagi.

Kata kunci: pakan, manajemen, ayam petelur, produksi

**FEEDING MANAGEMENT ON LAYING HEN PERIOD AT TRI
HONGGO REZEKI FARM (THR) JERUKSAWIT GONDANGREJO
KARANGANYAR CENTRAL JAVA**

By:

Laeli Robingatun Rizki
16/401265/SV/11769

ABSTRACT

Feeding management on laying hen periode influence the productivity of layer chicken. Good feeding management will be in line with good egg production. The writing of this Final Project aims to find out the feed management in laying hens in a production period, especially in the period of 3 -15 March 2018, in Tri Honggo Rezeki Farm Jeruksawit Gondangrejo Karanganyar, Central Java. The materials used in this writing were observation data and direct practice in Farm Tri Honggo Rezeki. Furthermore, the data collection methods used were observation, interview and direct practice in feeding activities at Tri Honggo Rezeki Farm. In THR Farm, hens in production period starts to be calculated when the hens were in the age of 22-70 weeks. The feed given was in the form of self-made feed with codes L1, L3 and L4. L1 is in the form of flour/mash contains protein content of 18,60 %, methionine 0,90%, calcium 4,2% and phosphorus 0.90%. Then, L3 was in the form of flour/mash contains protein content of 16,60%, methionine 0,90%, calcium 4,2%, phosphorus 0.9%. And as the same as previous feed, L4 feed is in the form of flour/mash contains protein content of 15.60%, methionine 0.90%, calcium 4.2% and phosphorus 0.9%. Based on the results and discussion, it could be concluded that feed management in laying hens during the production period at THR Farm was fairly good. Improve feed management and feed quality for a better results.

Key words: feed, management, layer, production