



KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang ada dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa perlakuan lama penggemukan, baik dua bulan, tiga bulan, maupun empat bulan tidak menunjukkan hasil yang berbeda secara nyata, baik pada kelompok bobot badan 250 kg atau pada kelompok bobot badan 300 kg.

Bobot awal ternyata memberikan pengaruh nyata terhadap bobot akhir. Dari hasil penelitian ini ternyata tidak terdapat interaksi antara perbedaan bobot awal dengan lama penggemukan yang berbeda

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diberikan beberapa saran:

1. Dengan mempertimbangkan biaya pakan per pertambahan bobot badan maka ternak dengan bobot awal 250kg akan lebih efisien jika digemukkan sampai dengan lama penggemukan 3 bulan. Sedang untuk bobot awal 300 kg, penggemukan 2 bulan merupakan lama penggemukan paling efisien, dengan biaya pakan per pertambahan bobot badan paling rendah.
2. Dengan mempertimbangkan bobot akhir yang diperoleh, disarankan untuk memilih ternak dengan bobot awal 300 kg. Diharapkan akan memperoleh bobot akhir yang tinggi.