

INTISARI

Latar Belakang : *Cancer-related fatigue* (CRF) merupakan salah satu gejala yang paling sering dialami penderita yang bersifat subjektif dan menetap. CRF dapat memberikan dampak negatif terhadap kualitas hidup pasien dan dapat merambat ke keadaan psikososial. Dalam menghadapi tanda dan gejala penyakit kanker khususnya yang menyebabkan dampak buruk bagi psikososial, dukungan sosial bermanfaat dalam mengatasi gangguan psikologis sehingga mengurangi dampak dari penyakit kanker yang diderita.

Tujuan Penelitian : Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran serta hubungan antara dukungan sosial dan CRF pada pasien kanker payudara.

Metode Penelitian : Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian analitik korelatif. Dengan rancangan *cross-sectional*. Penelitian dilakukan pada Desember 2016 sampai Maret 2017 di di IRNA II RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dan IRNA I RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta dengan jumlah sampel 110 pasien kanker payudara dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Pengambilan data menggunakan kuesioner *The Functional Assesment of Chronic Illness Therapy-Fatigue* (FACIT-F) dan kuesioner *The Multidimensional Scale of Perceived Social Support* (MSPSS).

Hasil : Dari penelitian ini, ditemukan bahwa 52,7% pasien kanker payudara mengalami CRF dan 93,6% responden menerima dukungan sosial yang tinggi. Hasil uji *Spearman Rank* menunjukkan tidak ada hubungan antara dukungan sosial dengan CRF pada pasien kanker payudara dengan arah korelasi negatif dengan kekuatan yang sangat lemah ($p = 0,704$ dan $r = -0,037$).

Kesimpulan : Tidak ada hubungan antara dukungan sosial dengan CRF pada pasien kanker payudara.

Kata kunci : Kanker payudara, *cancer-related fatigue*, dukungan sosial

ABSTRACT

Background: Cancer-related fatigue (CRF) is one of the most common symptoms of cancer patients that characterized by subjective and sedentary fatigue. CRF can cause a negative impact on the quality of life of the patient and can propagate to the psychosocial state. In the face of signs and symptoms of cancer, especially those that cause adverse effects on psychosocial, social support is useful in overcoming psychological disorders so as to reduce the impact of cancer symptoms.

Objective: To determine the description and the relationship of social support and CRF in breast cancer patients.

Method: The research method used is correlative analytic research with cross-sectional design. The research was conducted in December 2016 until March 2017 in IRNA II of RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto and IRNA I Dr. Sardjito Yogyakarta with a sample of 110 breast cancer patients was determined using purposive sampling method. Data were collected used the Functional Assessment of Chronic Illness Therapy-Fatigue (FACIT-F) questionnaire and the Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS) questionnaire.

Result: From this study, it was found that 52.7% of breast cancer patients experienced CRF and 93.6% of respondents received high social support. Spearman Rank test results showed no relationship between social support with CRF in breast cancer patients with negative correlation direction with very weak correlation ($p = 0.704$ and $r = -0.037$).

Conclusion: There is no relationship between social support with CRF in breast cancer patients.

Keywords: breast cancer, cancer-related fatigue, social support