

INTISARI

Latar Belakang: Kanker payudara merupakan penyakit yang dapat menyebabkan kematian yang mana insidensinya terus meningkat dari tahun ke tahun. Terapi kanker payudara dapat mengurangi angka kematian. Akan tetapi, beberapa masalah muncul seiring dengan terapi kanker payudara diantaranya masalah citra diri dan gangguan fungsi seksual.

Tujuan: Mengetahui gambaran citra diri dan fungsi seksual serta faktor-faktor yang berhubungan dengan citra diri dan fungsi seksual pada wanita usia subur yang sedang menjalani terapi kanker payudara di Rumah Sakit RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta.

Metode Penelitian: Penelitian deskriptif dengan rancangan *cross-sectional* ini dilaksanakan di Instalasi Kanker Tulip RSUP Dr Sardjito Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan pada Bulan Maret-Mei 2016 dengan menggunakan subyek 84 orang wanita usia produktif yang sedang menjalani terapi kanker payudara. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner citra diri “*Body Image Scale*” oleh Hopwood *et al.* dan kuesioner fungsi seksual “*Brief Index of Sexual Functioning for Women (BISF-W)*” oleh Mazer *et al.* Analisis data menggunakan uji *U Mann-Whitney*.

Hasil: Rerata nilai citra diri pasien adalah $7,74 \pm 5,59$, dapat disimpulkan bahwa citra diri pasien cenderung baik. Rerata nilai fungsi seksual pasien adalah $15,77 \pm 9,95$, dapat disimpulkan bahwa fungsi seksual pasien cenderung buruk. Terdapat perbedaan yang bermakna dalam citra diri antara responden yang menjalani radioterapi dengan yang tidak. Terdapat perbedaan yang bermakna dalam fungsi seksual antara responden yang berpenghasilan lebih dari UMR dengan yang berpenghasilan kurang dari/sama dengan UMR.

Kesimpulan: Wanita usia produktif yang menjalani terapi kanker payudara mengalami gangguan fungsi seksual.

Kata Kunci: citra diri, fungsi seksual, terapi kanker payudara.

ABSTRACT

Background: Breast cancer is kind of disease that can lead to death and the incidence continues to rise through years. Early detection and breast cancer treatment can reduce mortality incidence. However, some problems arise due to breast cancer therapy, including body image disturbance and sexual dysfunction.

Objective: to identify the body image and sexual function and those related factors in adult women undergo breast cancer treatment at Dr. Sardjito Hospital Yogyakarta.

Methods: a descriptive cross-sectional based study hold in “Tulip” cancer ward of Dr. Sardjito Hospital at March-May 2016. This study included 84 adult women undergo breast cancer treatment. Instrument used in this study are body image questionnaire “*Body Image Scale*” by Hopwood *et al.* (2001) and sexual function questionnaire “*Brief Index of Sexual Functioning for Women (BISF-W)*” by Mazer *et al.* (2000). Collected data were analyzed using *U Mann-Whitney* test.

Result: Patient’s body image mean score is $7,74 \pm 5,59$, it can be concluded that patient tend to have better body image. Patient sexual function mean score is $15,77 \pm 9,95$, it can be concluded that patient tend to have poor sexual function. There are significant differences in term of body image among patient who underwent radiotherapy and who did not. There are significant differences in term of sexual function among patient who earn more than the minimum wage and who earn less or equal to minimum wage.

Conclusion: Adult woman undergo breast cancer treatment experience sexual dysfunction.

Keywords: body image, breast cancer treatment, sexual function.