

INTISARI

PREVALENSI PENDERITA GANGGUAN AFEKTIF BIPOLAR DI RSUP DR. SARDJITO TAHUN 2012-2014

Septiana Rizki Fauziah¹,

Carla Raymondalexas Marchira², Budi Pratiti²

¹Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah
Mada, Yogyakarta, Indonesia

²Departemen Jiwa Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito, Yogyakarta, Indonesia

Latar belakang: Gangguan afektif bipolar merupakan gangguan mood yang mempunyai karakteristik adanya fluktuasi mood yang ekstrim dimulai dari euforia menjadi depresi berat, dan diperantarai oleh periode mood yang normal. Gangguan afektif bipolar merupakan masalah kesehatan mental yang penting yang terjadi hampir 2-4% dari populasi. Salah satu rumah sakit rujukan pasien gangguan afektif bipolar adalah RSUP Dr. Sardjito. Sampai saat ini belum pernah dilakukan penelitian prevalensi penderita gangguan afektif bipolar di RSUP Dr. Sardjito.

Tujuan: Mengetahui prevalensi penderita gangguan afektif bipolar berdasarkan usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status pekerjaan, status perkawinan, dan tipe bipolar di RSUP Dr. Sardjito tahun 2012-2014. Tipe bipolar digolongkan berdasarkan ICD 10.

Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan rancangan cross sectional dengan menggunakan data sekunder berupa rekam medis pasien gangguan afektif bipolar di RSUP Dr. Sardjito tahun 2012-2014.

Hasil: Prevalensi gangguan afektif bipolar di RSUP Dr. Sardjito pada tahun 2012-2014 adalah 1,97%. Gangguan afektif bipolar lebih banyak ditemukan pada perempuan (69,2%), kelompok usia 21-30 tahun (34,3%), tingkat pendidikan SMA (8%), status pekerjaan pelajar/mahasiswa (25,3%), berstatus sudah kawin (92%), dan dengan tipe gangguan afektif bipolar episode kini manik dengan gejala psikotik (40,1%).

Kesimpulan: Prevalensi gangguan afektif bipolar di RSUP Dr. Sarjito tahun 2012-2014 sebesar 1,97%.

Kata kunci: Gangguan afektif bipolar, prevalensi.

ABSTRACT

PREVALENCE OF BIPOLAR DISORDER IN RSUP DR. SARDJITO FROM 2012 TO 2014

Septiana Rizki Fauziah¹,

Carla Raymondalexas Marchira², Budi Pratiti²

¹Medical Doctor Program, Faculty of Medicine,
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

²Department of Psychiatry RSUP Dr. Sardjito,
Yogyakarta, Indonesia

Background: Bipolar affective disorder is a mood disorder that has the characteristics of extreme mood fluctuations starting from euphoria into a severe depression, and separated by periods of normal mood. Bipolar affective disorder is an important mental health issue that happens almost 2-4% of the population. One referral hospital for patients with bipolar affective disorder is RSUP Dr. Sardjito. Until now, research about prevalence of bipolar disorder in RSUP Dr. Sardjito has not been done yet.

Aim: The objective of this study is to determine the prevalence of patients with bipolar disorder sorted by age, gender, education level, employment status, marital status, and type of bipolar in RSUP Dr. Sardjito years 2012-2014. The type of bipolar is classified according to ICD 10.

Methods: This study is a descriptive with cross sectional design using secondary data from medical records of patients with bipolar disorder in RSUP Dr. Sardjito years 2012-2014.

Results: The prevalence of bipolar affective disorder in RSUP Dr. Sardjito in 2012-2014 is 1.97%. Bipolar disorder is more common in women (69.2%), age group 21-30 years (34.3%), level of high school education (8%), among students or university student (25.3%), married (92%), and mostly came by manic episode with psychotic feature.

Conclusion: The prevalence of bipolar affective disorder in RSUP Dr. Sardjito year 2012-2014 is 1.97%.

Keywords: Bipolar Disorders, prevalence.