

INTISARI

Program JKN bertujuan meningkatkan akses pelayanan kesehatan sehingga dapat mempertahankan kesejahteraan masyarakat yang berpotensi menurun akibat masalah kesehatan. Dalam pelaksanaannya, BPJS selaku penyelenggara JKN selalu defisit dengan beban terbesar berupa biaya pelayanan penyakit kronis. Hipertensi merupakan salah satu faktor resiko utama yang dapat dikendalikan dari penyakit kronis, namun kesadaran dan pengendalian hipertensi masih rendah. Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh penderita hipertensi dan dampak program JKN terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan penderita hipertensi.

Kelompok penderita hipertensi peserta JKN dibandingkan dengan non peserta JKN menggunakan metode DID dikombinasikan PSM. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepesertaan dalam program JKN tidak memberikan dampak terhadap kemungkinan pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh penderita penyakit hipertensi. Faktor yang mempengaruhi peningkatan kemungkinan pemanfaatan adalah status perkawinan, status ekonomi, dan wilayah tempat tinggal. Dan faktor yang mempengaruhi penurunan kemungkinan pemanfaatan adalah aktivitas fisik, persepsi kesehatan, status gizi, dan status pekerjaan.

Kata kunci: JKN, pelayanan kesehatan, hipertensi, PSM, DID, IFLS

ABSTRACT

The JKN program aims to increase access to health services so as to maintain the welfare of the community that has the potential to decline due to health problems. In its implementation, BPJS as the organizer of JKN always has a deficit with the biggest burden in the form of chronic disease service costs. Hypertension is one of the main risk factors that can be controlled from chronic disease, but awareness and control of hypertension is still low. This study aims to determine the factors that influence the utilization of health services by patients with hypertension and the impact of the JKN program on the utilization of health services for patients with hypertension.

The group of patients with hypertension who participated in JKN was compared with non-JKN participants using the DID method combined with PSM. The results of this study indicate that participation in the JKN program does not have an impact on the possibility of using health services by people with hypertension. Factors that influence the increase in the possibility of utilization are marital status, economic status, and area of residence. And the factors that influence the decrease in the possibility of utilization are physical activity, health perception, nutritional status, and employment status.

Keywords: JKN, health services, hypertension, PSM, DID, IFLS